


Ожоги, обморожения



Ожоги у детей обычно происходят при попадании на кожу горячих жидкостей. Реже встречаются ожоги от пламени, и совсем редко — химические ожоги, но они имеют тяжелые последствия. Обморожения происходят вследствие воздействия низких температур.

В зависимости от длительности воздействия и температуры ожоги и обморожения бывают глубокими или поверхностными. В зависимости от площади контакта повреждения бывают обширными и ограниченными. Чем выше площадь повреждения и меньше возраст ребенка, тем тяжелее состояние пострадавшего и выше угроза жизни. Поверхностные ожоги заживают сами, глубокие требуют пересадки кожи и долго заживают.

Профилактика ожогов и обморожений

! Оградите кухонную плиту решеткой безопасности.

! Соблюдайте правила противопожарной безопасности, никогда не оставляйте ребенка у открытого огня и возле раскаленных предметов. Подавайте пример безопасного обращения с ними.

! Не оставляйте без присмотра утюги и электронагревательные приборы.

! Одевайте ребенка по сезону. Если ребенок плачет на морозе, — возможно, у него замерзли руки или лицо, которые требуют немедленного согревания.

! Исключите намочание одежды на морозе и контакт голый кожи с промерзшими предметами.



Первая помощь при ожогах и обморожениях

! Прекратите воздействие опасной температуры, вытащите ребенка из огня, снимите горящую одежду.

! Не заливайте горящую одежду водой: при этом выделяется пар, способный усилить ожог. Не накрывайте горящую одежду тканью для тушения — горящая ткань прижмется к коже, и ожог усилится.

! На пораженные поверхности как можно скорее наложите сухие стерильные салфетки без пропитки. При наложении повязки используйте водные антисептики (фурацилин, перекись водорода, слабый раствор марганцовки) или водорастворимые мази (левомеколь, левосин, диоксиколь).

! Вызовите «скорую помощь»; если это невозможно — доставьте ребенка в медицинское учреждение самостоятельно. Возможно развитие ожогового шока, требующего участия медработников.

! Не прокалывайте пузыри, не промывайте раны и не смазывайте пораженные участки лекарствами.

! При ожогах и обморожениях происходит большая потеря жидкости, поэтому давайте ребенку напитки (воду, соки, чай, молоко) в неограниченном количестве; в больнице, возможно, потребуется введение жидкости в вену.

! До прибытия врачей дайте ребенку обезболивающее (парацетамол, анальгин, эффералган, нимесулид). Предпочтение отдавайте препаратам в свечах — они действуют на ребенка более эффективно.

! При обширных и глубоких ожогах транспортируйте ребенка как при переломах — используйте картонные шины поверх асептических повязок.

! В точности соблюдайте указания врачей после оказания помощи.

